

Farmakologický účinek:

Todikamp má silné membránostabilizační, protizánětlivé a protinádorové účinky. Eliminuje mezilehlé a intersticiální edémy, přispívá ke vstřebávání hematomů a posttraumatických infiltrátů. Snižuje projevy alergických reakcí při celkové desenzibilizaci organismu. Obnovuje krevní obraz, aktivuje procesy buněčné imunity, zvyšuje fagocytární aktivitu makrofágů a stimuluje chemotaxi; blokuje volné radikály a brzdí procesy peroxidace lipidů; vykazuje antibakteriální a antifungální aktivitu, zabraňuje pronikání virových agens přes buněčnou membránu, zvyšuje metabolismus v těle a normalizuje hormonální rovnováhu; obnovuje funkci jater a má mírný choleretický účinek.

Způsob použití:

Přípravek se používá k léčbě pacientů, trpících akutními i chronickými infekčními chorobami, zhoubnými i nezhoubnými nádory, metabolickými poruchami, poruchami kardiovaskulárního systému, imunologickými poruchami, při obnově organismu po těžkých otravách a radiačním poškození.

Způsoby aplikace:

Přípravek pro orální a zevní užití.

Vnitřně:

Todikamp užívejte perorálně ve výši 1 kapka na 2 kg váhy 1-3 x / denně 30 minut před jídlem. Doporučuje se začít se 7 kapkami a postupně navyšovat do vypočtené dávky. Při těžkých onkologických onemocněních může být dávka zvýšena trojnásobně, vždy se zapíjí 1 lžící lněného oleje. V případě intoxikace (nevolnost, bolesti hlavy, slabost, snížení apetitu) přerušit příjem na dva dny a zmenšit dávku na 5 kapek. Projevy těchto příznaků svědčí o ozdravení ohniska infekce, smrti nádorových buněk a vstupu produktů rozpadu do krevního řečiště. Takže se doporučuje příjem bohaté alkalické vody a příjem sorbentů (zeolit, bílá hlína /jíl/ atd).

Obklady:

Čistou gázu, přeloženou do 4 vrstev, o velikosti dlaně zvlhčit Todikampem (ne více, než jednou čajovou lžičkou) a přiložit na kůži v oblasti postiženého orgánu. Přes gázu použijte kompresní obvaz a silnou tkaninu. Po 20-ti minutách obvaz sejmout a kůži potříť olivovým olejem. Používá se na hluboké léze kloubů a poškození vnitřních orgánů.

Vtírání:

Nevelké množství Todikampu nanést na kůži a vtírat do úplného vstřebání. Používá se na podkožní, svalové a kloubní léze.

Mazání:

Todikamp nanést na poškozenou kůži bez vtírání. Použít při povrchových poraněních pokožky a podkožní tukové tkáně.

Vstřikování:

1ml Todikampu zavést do vagíny pomocí stříkačky (bez jehly). Efektivní při léčbě patologie děložního čípku a pánevních orgánů.

Mikroklyzma:

3-5 ml Todikampa smíchat s 5 ml lněného oleje a zavést do konečníku.

www.todikamp.cz

